

La tuberculose chez les enfants : Connaître les symptômes, recevoir des soins rapidement

Les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans, courent un plus grand risque de développer des formes de tuberculose **graves et potentiellement mortelles** s'ils ne reçoivent pas des soins à temps.

Les enfants inuits et des Premières Nations peuvent connaître des taux de tuberculose plus élevés, en grande partie parce qu'ils vivent dans des communautés où les logements sont surpeuplés et où l'accès aux soins de santé est limité.



La tuberculose se propage par voie aérienne lorsqu'une personne atteinte d'une tuberculose contagieuse tousse, éternue ou parle. La tuberculose se transmet plus facilement lorsque les gens vivent dans des espaces restreints.

En restant attentif et en agissant tôt, vous pouvez protéger la santé et le bien-être de vos enfants.

La tuberculose peut être traitée et guérie avec les médicaments appropriés. Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé et posez-lui des questions sur le dépistage et le diagnostic de la tuberculose, ainsi que sur les soins adaptés à la culture.

Si votre enfant présente des symptômes de la tuberculose ou y a été exposé, faites-le vérifier dès aujourd'hui!



Surveillez les symptômes chez vos enfants :



perte de poids ou
croissance lente



difficultés
respiratoires



toux persistante



toux avec mucus
ou sang



fièvre ou sueurs
nocturnes



fatigue ou
irritabilité



**Pour de plus amples
renseignements :**
La tuberculose dans les
communautés autochtones



ISBN : 978-0-660-98159-8
Catalogue : RI22-108/2026F-PDF



Services aux
Autochtones Canada

Indigenous Services
Canada

Canada