

# STAPHYLOCOCCUS AUREUS RÉSISTANT À LA MÉTHICILLINE (SARM)

Le SARM est une bactérie (microbe) qui provoque des infections et qui résiste à des antibiotiques couramment utilisés.

## COMMENT SE TRANSMET-IL ?

Une infection à SARM se transmet par contact direct de peau à peau avec une personne infectée ou par contact avec des objets contaminés.

La bactérie pénètre dans l'organisme par une coupure, une égratignure ou une autre plaie ouverte.



## LES SYMPTÔMES


Les infections se manifestent généralement par des boutons, des furoncles ou des piqûres d'araignée sur la peau.

La région touchée peut être enflée, rouge ou douloureuse, et présenter du pus ou un écoulement.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Les staphylocoques peuvent survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, voire plusieurs semaines.

Le partage d'objets contaminés peut favoriser la transmission du SARM et accroître le risque d'infection.



## TRAITEMENT

Pour traiter une infection à SARM, un médecin ou une infirmière peut administrer des antibiotiques autres que la méthicilline ou procéder au drainage du pus de la plaie à l'aide d'une aiguille ou d'une seringue.

## PRÉVENTION

Se laver régulièrement les mains et le corps à l'eau et au savon

Éviter de partager des articles personnels (p. ex. serviettes, rasoirs, draps, savons, etc.)

Jeter rapidement et de façon sécuritaire les pansements et autres articles de soins usagés



Centre de collaboration nationale  
des maladies infectieuses  
National Collaborating Centre  
for Infectious Diseases

La publication de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada qui finance le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses. Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement celles de l'Agence de la santé publique du Canada.